

Виодове болка в корема при децата.

Менструация

У големите момичета могат да се наблюдават периодично повтарящи се коремни болки във връзка с появата на менструация.

Болките се появяват преди или в самото начало на менструацията и могат да продължат през цялото ѝ времетраене. Те са клинообразни или тъпи. Разполагат се в долната половина на корема.

Ацетонимично периодично повръщане

Срещащото се у нервни деца ацетонимично периодично повръщане може също да се съпровожда със силни коремни болки. Разпознава се по киселия ацетонов дъх на повърнатото и установяването на ацетон в урината. Някои заболявания на бъбреците и пикочните пътища също протичат с неясни коремни болки. Най-често тези болки се разполагат в хълбочната област и могат да се излъчват към пикочния мехур. Болките са колики образни, повтарят се често и не са така силни. Наблюдават се при вродени аномалии на отделителната система (например подвижен бъбрек, двоен бъбрек, подковообразен бъбрек, разширено бъбречно легенче и др.), а също така и при остри възпаления на бъбреците и пикочните пътища.

Пикочно каменната болест у децата също се изявява със силни коремни болки, които се излъчват към пикочния мехур, придружават се от появата на кръв в урината и затруднения в уринирането.

Жлъчните колики, които се дължат на аномалии, камъни или възпаление на жлъчните пътища, се срещат рядко при децата и могат да се изявят с коремни болки. Болките

имат коликообразен характер, отначало се усещат по целия корем, а после се ограничават в дясното подребрие, където е разположен черния дроб. Тези болки понякога се излъчват към дясната плешка или дясно рамо.

Запекът се среща също така и в детска възраст и при него коремните болки не са рядка проява. Децата се оплакват от болки около пъпа или лявата половина на корема. Болките идват на пристъпи, появата се внезапно и неочаквано изчезват. Причините за запек и неговото лечение трябва да се поставят и да бъдат решавани от лекаря.