

Недоносено бебе. Колко тежи недоносеното бебе?

Бебе, което тежи много под 2.5 кг, ще трябва вероятно да остане в болницата, където ще има на разположение кувьоз и за него ще се полагат, специални грижи.

Трудно е да се превъзмогне безпокойството. Повечето недоносени бебета се развиват съвсем нормално, като се има предвид, че се раждат преждевременно. Макар че в началото наддават бавно, по-късно за известно време наддават и растат бързо, за да наваксат. Те естествено не могат да наваксат съвсем, защото са по-малки. Щом стане на една година бебето, родено 2 месеца преждевременно, трябва да се смята за десетмесечно.

Когато недоносеното бебе стигне тегло около 3 кг, то вече не се нуждае от специални грижи и тревоги, от което и да било друго, но родителите много трудно могат да повярват. Не е изключено в началото лекарят да е предупредил родителите да не бъдат големи оптимисти, но впоследствие все повече се успокояват. Бебето навярно е трябвало да бъде в кувьоз, под непрекъснатото наблюдение на лекарите и медицинските сестри, и първоначално са го хранели със сонда. През по-голямата част от времето родителите може би не са били при него, макар че сега в много болници насърчават родителите да докосват бебето и, когато е възможно, да го гушкат и да го хранят още от самото начало. Майката е трябвало да се прибере от болницата без бебето и заедно с бащата в продължение на седмици са водили някакъв странен живот на родители, които на теория имат бебе, без обаче да могат напълно да го почувстват.

Време за прибиране на недоносеното ☐ бебето вкъщи

Когато дойде време да си го вземат родителите понякога се чувстват доста уплашени и несигурни. Лекарите и медицинските сестри разбират тези чувства на несигурност и могат да помогнат на родителите да ги превъзмогнат. За да сте сигурни, че правите всичко както трябва, опитайте се под контрола на медицинската сестра да се упражнявате в полагане на грижите, от които бебето ще се нуждае вкъщи. През

последните няколко дни преди изписването на бебето е полезно да прекарате колкото е възможно повече време в болницата.