Морбили. Описание на дребна шарка /морбили/

Народът я нарича дребна шарка, но това една от най-тежко протичащите шарки в детската възраст. Причинява се от вирус, който е много слабо устойчив във външната среда.

Морили. Начин на заразяване с морбили

Заразяването става по въздушно-капков път - чрез пръски от гърлото на болните при кашляне или кихане. Входна врата на заразата е лигавицата на носа, гърлото, трахеята и конюнктивите на очите. Болестта е крайно заразна, не се заразяват само кърмачета до 4-6-месечна възраст.

Инкубационен период на морбили

Инкубационният период се колебае от 9 до 15 дни.

Симптоми на морбили

Началният период на болестта се характеризира с повишена температура и постепенно засилващи се катарални прояви: остра и понякога дрезгава кашлица, кихане, хрема, сълзене и зачервяване на очите, зачервяване на гърлото и сливиците. Лицето е подпухнало. Апетитът е намален или напълно липсва. На 2-3-ия ден върху лигавицата на устната кухина (срещу кътниците) се появяват сивобелезникави петънца, подобни на пръски от вар, които се отстраняват много трудно. На 3-4-ия ден повишената температура спада за много кратко време и на 4-5-ия ден отново се повишава до 39-40

градуса по целзий. Кашлицата и катаралните прояви се засилват като често се появява ларингит. Появява се обилен петнист обрив, който започва от лицето (зад ушите) и за 2-4 дни се разпространява по тялото и крайниците. Обривът се състои от яркочервени петна и неправилна форма, леко надигнати над околната кожа като разпложената между тях кожа е бледа. Непосредствено преди обрива и при неговото появяване децата стават много неспокойни, сънливи, отпуснати, понякога съзнанието им може да се замъгли и дори могат да получат краткотрайни гърчове. Отказват всякаква храна. Лимфните възли на шията се увеличават умерено. След пълното развитие на обрива настъпва постепенно оздравяване -- температурата спада, катаралните прояви постепенно стихват, обривите петна придобиват кафеникав цвят и постепенно избледняват.

Прогнози при морбили

В редки случаи брусницата може да даде усложнения : пневмония, енцефалит, отит и др.

Профилактика на морбили

За да се предпазят здравите, болните деца трябва да бъдат изолирани в дома най-малко до петия ден след появата на обрива. На контактните деца (до 2-3-ия ден след контакта) се инжектира гама-глобулин, който предпазва от заболяване. Най-сигурното предпазно средство е противоморбилната ваксина, която се прилага у нас.