

Ентеробиоза. Описание на ентеробиоза

Ентеробиозата е най-честото глистно заболяване у децата. Причинява се от дребните глисти - острици, които са дълги около 1 см, имат белезникав цвят и заострен заден край. От погълнатите яйца в червата се излюпват ларви, които в долната част на тънкото черво и в слепото черво достигат полово съзряване и женските стават годни да снасят яйца. Средната продължителност на живота на остриците е около 3-4 седмици. Мъжките екземпляри наскоро след оплождането умират, а женските се спускат към правото черво и в областта около ануса снасят 10000-20000 яйца. Наскоро след това и женските екземпляри умират. Снесените яйца узряват в продължение на 5-6 часа и стават годни за ново заразяване или самозаразяване на детето.

Ентеробиоза. Заразяване с ентеробиоза

Заразяването става чрез замърсени ръце, предмети, консумиране на замърсени хранителни продукти. В детските ясли и градини често се замърсява пясъкът, с които децата обичат да играят. Замърсените ръце, навикът на децата да разчесват кожата в областта около ануса, попадането на яйца в бельото и праха - всичко това дава възможност за чести и многократни заразявания. В много случаи е налице заразяване на цялото семейство. Липсва придобит имунитет. Опаразитеният човек е единствен източник на заразата.

Ентеробиоза. Симптоми на ентеробиоза

Ентеробиозата протича леко. Болестните прояви зависят от броя на паразитите и чувствителността на организма. Характерен симптом е сърбежът в аналната област. При момичетата може да има сърбеж и в половите органи. Пристъпите от сърбеж около ануса траят няколко дни и се повтарят през интервали от 2-4 седмици. В редки случаи може да има оплаквания от нарушен апетит, повишена раздразнителност, неспокоен сън, коремни болки, главоболие, диария и други.

Диагнозата се осигурява чрез намиране под микроскоп на яйца на остриците в препарата, получен чрез остъргване в областта около ануса. В самите изпражнения яйцата рядко се доказват.

Ентеробиоза. Предпазване от ентеробиоза

Предпазването се осъществява чрез създаване у децата на хигиенни навици - миене на ръцете преди всяко ядене и след ходене по малка и голяма нужда, редовно измиване на ноктите, често къпане, изваряване на бельото и гладене с гореща ютия. Така ще успеете да ограничите разпространението на ентеробиозата.