

### **Аборт. Описание на признаците за настъпващ аборт**

Първият признак на започващия аборт е кръвотечението, а по-късно и болките ниско в корема или кръста, които при бременност от 3-ия до 5-ия месец биват по-силни с характер на присвивания (присвиващи болки). Когато кръвотечението от половите органи се засилва, заплашващият аборт преминава в по-напреднал стадий -започващ аборт. Тогава маточната шийка се разтваря и вероятност за задържане на бременността няма. Ако наред с обилното кръвотечение и болки изпаднат и месести парчета, значи, че абортът е станал, но не е завършен - непълен аборт. Ето защо всяка бременна още при първите признаци, като слабо кръвотечение от половите органи и болки ниско в корема, трябва да се обърне към наблюдаващия лекар, за да се вземат мерки за запазване на бременността и по-нататъшното ѝ развитие.

### **Случаи на задържан аборт**

Съществуват случаи и на станал аборт, когато плодното яйце се е отделило от стените на матката, престанало е да се развива, обаче не е изхвърлено от матката и продължава да стои в маточната кухина. Този аборт се нарича задържан аборт. Жената е имала кръвотечение и болки в първите месеци на бременността, след което тези признаци са изчезнали, каналът на матката се е затворил и яйцето се е задържало в маточната кухина.

Когато бременността не се развива, матката не расте, понякога дори намалява обема си, лекарят изпраща бременната в болнично заведение, за да бъде почистена маточната кухина чрез кюретаж.

В случаите, когато е налице непълен аборт, с обилно или умерено кръвотечение от половите органи, налага се бременната да постъпи в болнично заведение, за да се направи кюретаж, да се спре кръвотечението за да се предпази жената от усложнения.